

Birds around Cairns, tropical Queensland
21-08-98 – 04-09-98
Hidde Bult

Synoptic Itinerary

- 20-8 Putte (16.30) – Zaventem (BA 399, 19:30)-Heathrow (BA/QF 352, 22:30);
- 21-8 after 12h 45 min arrival Singapore (18:15), dept. for Brisbane 19:40;
- 22-8 after 6h45min BA 352 arrives at Brisbane 04:38; Dept QF 608, 08:35, Arr. Cairns 10:50, taxi to Regency Palm Appt., in north Cairns suburbia. Stroll along esplanade to city center 13:30-18:00. On 23, 24, 26 and 27-8 most time spent at International Congress.
- 23-8 Flecker Botanic Gardens, Cairns, 08:30-11:30, 7/8 overcast, 25-27°C, SE 0-2
- 25-8 McLeod St, - north Esplanade, Cairns, 06:10-08:30, 5/8 overcast after rain, SE 3, 20°C. Congress tour: bus ride (dept. 09:40) for Kuranda skyrail, lunch plus stroll in Kuranda, return by scenic train, arr. 16:00 Cairns. Then visit to Flecker Botanic Gardens and Centenary lakes (16:15-18:00), walk along Esplanade to marina (18:10-19:00).
- 28-8 From Cairns marina with Sea Star II (dept. 07:20) to Michaelmas Cay (arr. 10:00, dept. 11:30) and Hastings reef for snorkeling (12:30 - 14:30), arr. Cairns 17:00.
- 29-8. Daihatsu Charade rented at “All One Car Rentals” (Au. \$ 252 for 6 days, 2100 km covered), dept. 09:00. First Mangrove trail (North Cairns, near airport 09:10-11:15). Then Cook highway to Port Douglas (arr. 12:30, dept.13:30) and to Kingfisher Park near Julatten (arr. 14:30) for a three nights stay in a double bed bunker sleeper (Au \$ 20/night). High tea spent at bird feeders. After some shopping in Mt. Molloy, from 17:20 to orchard and stream in Kingfisher Park for Platypus (seen well at 18:15 2, 18:20, 18:29).
- 30-8. Crispy morning stroll in Orchard of Kingfisher Park; after breakfast to Abattoir Swamp (rather dry), Mt Molloy and cemetery (old bowers of Gt. Bower Bird) and Lake Mitchell (12:00-15:25 4/8 clouds, 29°C, SE 3-4). Thereafter to dam at Mt. Carbine (16:40-17:30), then grass fields near West Mary Road, 7 km E of Mt Carbine, until sunset (18:10), via Lister Creek back to Kingfisher Park (arr. 19:15).
- 31-8 From dawn (from 06:10 visibility sufficient) stroll around Kingfisher Park. By car to Mossman Gorge in Daintree Forest (Rainforest trail, 08:10-11:05). Then to Daintree, boat trip on Daintree river (13:00 – 14:05). Via cane fields back to Pt. Douglas, visit of The Rainforest Habitat Wildlife Sanctuary (15:10-16:30, not recommendable for birdwatchers). Back to Julatten, visit of rainforest along Mt. Lewis Road (16:50-17:45) spoilt by heavy rain. Return to Kingfisher Park at 18:25 (complete overcast and showers).
- 01-9 At 06:00 wake up call by Laughing Kookaburra. From 06:30 visibility sufficient, walk through orchard. Thereafter to W. Mary Road (grass fields E. of Mt. Carbine, 08:00-), Lily Pond near Mt. Molloy (10:50-11:15), Mt. Molloy (11:20-12:30), Lake Mitchell (12:45-14:45, 3/8 clouds, 29°C, SE 4), walk over dam. Then via Tolga to Yungaburra, arrival at 16:00 for a 1 night stay in Kookaburra Lodge. Visit to Lake Barrine (crater lake with rainforest rim), where I met with the single Southern Cassowary at the edge of the car park, and walk in the forest until dusk (16:30-18:30) .

- 02-09. Before breakfast walk through Yungaburra (06:35-07:30, 28°C, no wind, 7/8 cloud cover after rain). Then via Atherton to Hastie Swamp (08:20-10:00, from 9:00 drizzle, later unseasonable rain for most of morning). Via Wongabel State Forest (pair of Black Necked Storks in pond) to Broomfield Crater Marsh (11:00-11:30). Thereafter to Crater NP, via short trail to crater (11:45-12:15), not many birds seen due to heavy rains. Via Ravenshoe (lunch), Millaa-Millaa (scenic view at edge of Atherton Table lands) to coast. At the August Moon Campsite, near S. Innisfail (breeding colony of Metallic Starling) a van rented for 1 night. Then to Tom O' Shanke Lowland Rainforest Reserve (near Mission Beach). Trail to S. from Lacey Creek car park (16:20 – 18:10). Highlight is a close encounter with 2 Cassowaries (17:20-17:30), return to car park at dusk and dinner in Mission Beach (plenty of accommodation), return to S. Innisfail (20:00).
- 03-09. Before dawn from S. Innisfail to Lacey Creek car park, arr. 06:30, breakfast at picnic site (fresh Cassowary droppings) until rain stops (07:00), thereafter picnic trail. Walk along south-west trail (08:05-10:00) does not produce many novelties. Via South Mission Beach, where a Cassowary is seen along the Tulla Road (near Ligualla), return to August Moon, drive along cloud covered Mt. Marble Frere, 1622 m, highest mountain in Qld) to the Little Kingfisher site near Edmonton (13:00-14:00, low tide, without success). From 14:50 – 16:30 Esplanade, in coming tide with nice wader collection. After returning the Daihatsu, cab taken to Centenary Lakes (17:00-18:05) and cemetery (18:05-18:40).
- 04-09. Wake up at 04:10, at 04:45 10 min taxi drive to airport. QS 600 (06:00) to Melbourne (arr. 11:10) with stop over in Brisbane. Flight BA 301 2 h delayed, dept. from Melbourne 14:30, via Sydney (15:35-17:15), Bangkok (05-09, 02:30-04:00) to Heathrow (arr. 06:50 on 05-09). It took 70 min to reach terminal 1, 08.55 BA 392 to Brussels, arr. 11:05. Paper work for lost luggage (which didn't get through at Heathrow due to the delay) took some time, arr. Putte 14:00 on 05-09 (total length of journey 42 hours).

Site information

Cairns: at sunset huge flocks of Rainbow Lorikeets with smaller numbers of Varied Lorikeets flew in from far north to their sleeping trees in downtown Cairns using a step and jump approach. Australian Hobby, twice hunting above town at sunset.

Flecker Botanical Gardens and Centenary Lakes, Cairns. Lovely ponds, plus boardwalk through remnant of lowland rainforest: Darter, Great and Intermediate Egret, Straw-necked and Sacred Ibis, Magpie Geese, Oriental Black Duck, Brahminy Kite, Nankeen (= Australian Kestrel), Osprey (nest), Common Sandpiper, Orange-footed Scrubfowl, Brush Turkey, Sacred Kingfisher, Torresian Imperial-pigeon, Blue-cheeked Rosella, Rainbow Bee-eater, Mangrove Gerygone, Leaden Flycatcher, Varied Triller, Brown-backed Honeyeater, Spangled Drongo, Helmeted Friarbird (abundant), Figbird (common), Yellow Oriole, Pied Currawong, Black Butcherbird, Spice Finch, White-breasted Woodswallow.

Esplanade, Cairns. Australian Pelican (28+), Royal Spoonbill (1-6), Straw-necked and Sacred Ibis, White-faced Heron (1-6), Great Egret, Osprey, Masked Lapwing, Eastern Curlew (3-7), Whimbrel (subsp. *variegata*, 1-4), Bar-tailed Godwit (2-10), Grey-tailed

Tattler (3-8), Gull-billed Tern (15+) and Silver Gull always present, other waders in variable numbers. Best day 03-09 with Mangrove (or Striated) Heron, White-bellied Sea-eagle plus 17 wader species including Beach Thick-knee, Great (47) and Red (2) Knot, Lesser and Greater Sand-Plover (next to each other), Red-capped Plover, Sharp-tailed Sandpiper, Red-necked Stint, Black-tailed Godwit. Eastern Reef Egret (once 2), Pacific Golden Plover and Ruddy Turnstone on previous visits.

Mangrove trail, Airway Ave., Cairns. Boardwalk through mangroves, Saltwater Creek: Torresian Imperial-Pigeon, Collared (Mangrove) Kingfisher 1pr, White-bellied Cuckoo-shrike, Shining Flycatcher 1pr, Lovely Fairy Wren, Varied Honeyeater (common).

Michaelmas Cay, inner Barrier reef, Cairns. Tern colony with declining numbers of Sooty (4000 pr) and Crested (1500 pr) Tern, Common Noddy (3000 pr), and smaller numbers of Silver Gull (40 seen), Black-Naped (80 seen), Bridled Tern (3+ seen) and White-capped Noddy (2+ seen). Brown Booby (150) and Ruddy Turnstone on the beach, but no trace of Lesser Crested Tern or Frigate Birds. Latter not recorded in past three weeks by warden, better chances at Green Island, there also Boobies and Red-tailed Tropicbird. Trip with Sea Star II is 2nd cheapest (Au. \$ 50, including \$5 reef tax, free lunch and snorkeling gear; wetsuit Au \$5), friendly crew, good value for money.

Mossman Gorge, Daintree Forest. Scenic rainforest trail along stream, though noise of stream sometimes embarrassing. Wompoo Fruit-Dove (seen well), Little Shrike-thrush 3, Victoria Riflebird 4 + heard, Eurasian Jay-like “yaas”, a poor imitation attracts a splendid male, Noisy Pitta 5+, Lewin’s (common) and MacLeay’s (several) Honeyeater. After 10 am place gets crowded as dozens of busses spawn loads of tourists.

Daintree River Cruise, 12:55-14:05, MV Matilda (Au \$ 12, from cruise center, 6.2 km S. of village). Three small and one medium-sized (3 m) Saltwater Crocodiles, 1 female Amethyst Python, White-lipped Tree Frog and some birds: Osprey, Brahminy Kite and UFO raptor (Little Eagle or Whistling Kite), several Mistletoe birds, nests of Large-billed Gerygone, Sunbird, and Dusky Honeyeater. There are several tour operators operating from the Daintree village jetty, the highest rating was given to Chris Dahlberg’s Specialized River Tours. Changes of seeing Crocs increase if a downstream tour (closer to the sea) is booked.

Kingfisher Park. Ideal lodging facilities for birdwatchers. Traces of rainforest and orchard. Bird feeders near main building offer superb opportunities to see Blue-faced, MacLeay’s, Lewin’s, Graceful, Dusky, and White-throated Honeyeaters. In orchard Rufous Fantail, Spectacled Monarch, Grey-headed and Pale yellow Robin, Topknot Pigeon, Emerald and Peaceful Dove, Orange-footed Scrubfowl, Australian Brush Turkey, Wompoo Fruit-Dove, Laughing and Blue-winged Kookaburra, Double-eyed Fig-Parrot and Spotted Catbird. Swimming Platypus can be seen easily in the little stream at dawn and dusk.

Mt Molloy. In the village Great Bowerbird, Blue-faced Honeyeater, Noisy and Little Friar-birds. In a garden near the Centennial Pond (Blue-winged Kookaburra and Forest Kingfisher) the only Yellow-spotted Honeyeater of the trip.

Abattoir Swamp, with hide along Rex Hwy between Kingfisher Park and Mt. Molloy: rather dry at the time, Rufous Whistler, Forrest Kingfisher and several restless White-gaped Honeyeaters.

Lilly Pond. Take Weatherby Rd, starting from rest area near Rifle Creek, N. of Mt Molly. Briefly visited, not too many birds: Magpie Goose, Comb-crested Jacana, Pheasant-tailed Coucal. Good for pygmy-geese, but none seen.

Lake Mitchell: huge artificial lake S. of Mt Molloy, beautiful shoreline teeming with birds. After entering the fence, walk over artificial dam. All spoonbills and ibis, Au. Pelican, Darter, Cormorants, Black-necked Stork, herons and egrets, Hardhead, Radjah Shelduck, White-bellied Sea-eagle, Whistling Kite, Brolga (breeding pair), the magnificent Black-fronted Dotterel, Black-winged Stilt, Comb-crested Jacana, Gull-billed, Whiskered and Caspian Tern, Grey-crowned Babbler and Pale-headed Rosella.

Mt. Carbine, West Mary Road (N): grassy area held several Australian Bustards, Golden-headed Cisticola, a superb male Spotted Harrier, Galah and Red-winged Parrot in gum trees. Dam SW of Mt Carbine not too many birds due to disturbance: Darter, cormorants, Black-eared Cuckoo, many Noisy and Little Friarbirds.

Yungaburra-Atherton area. Sarus cranes, Swamp-harrier, Purple Swamphen and Black-faced Cuckoo-shrike seen at several sites. Black-necked Stork in pond, Wongabel State Forest.

Lake Barrine. Rim of rainforest around beautiful crater lake. Surprisingly I saw the only Southern Cassowary of the park. Rainforest birds included Au. Brush Turkey, Victoria's rifle bird (several heard, a female seen very well), Spotted Catbird, Yellow-throated Scrubwren, Spectacled and Pied Monarch, Chowchilla, Eastern Whipbird, Grey-headed Robin. Lake and shore held Wandering Whistling Duck, Hardhead, Dusky Moorhen

Hastie Swamp. Hastie-Koci Rd junction, near railway, S. of Atherton. Lovely swamp, many Pied Geese and Plumed Whistling Ducks; colony of Purple Swamphen. Hardhead, Pink-eared Duck, Wandering Whistling Duck, Swamp Harrier, Whistling Kite, Buff-banded Rail, Au. Kestrel. Dozens of Sarus cranes on fields in vicinity.

Broomfield Crater Marsh. Very wide crater with marsh and grasslands. Briefly visited, not too many birds and at quite a distance. Wedge-tailed Eagle (1 moulting) and Sarus Cranes. Drizzle starts.

Crater NP. Rainforest near Barron River. Short rainforest track to impressive and deep, water-filled crater. Birding hampered by the unseasonable, pouring rain. Bridled Honeyeater, Blue-cheeked Rosella and Grey Fantail seen.

Tom O' Shanke Lowland Rainforest (Mission Beach). Probably best site in Australia to find the endangered and decreasing Southern Cassowary (Present estimate 500 birds in Australia. Visited 02-09-1998 16.20-18.10 (dusk). Car parked at Lacey Creek picnic site, took the rainforest trail to Licuala on the opposite side (South) of the El Arish – Mission Beach Rd . First Cassowary droppings found after about 1.5 km. A little later I hear rustling in the forest and a few seconds later I have eye contact with two adult Cassowaries (17.20-17.30), preening 10 m off the track. One is slightly larger and brighter colored,

presumably the female. Normally the birds are solitary and the polyandrous female only meets males for mating. Very close, magnificent views of hairy feathers, blue and red neck skin, free-swinging crimson wattles, heavy casque and powerful legs and toes. As the birds produce a rattling grumbling, I move prudently, remembering Simpson and Day's warning that adults are aggressive, kick and should be approached with care. After a while the birds start feeding and vanish in the rainforest. The next morning (03-09, 06.30-10.30) I return to Lacey Creek before dawn and take shelter from the rain in the picnic hut to have breakfast. At 07.00 the rain stops, the circular track around the picnic site produces fresh Cassowary droppings, a displaying Satin Bowerbird, two pairs of Spotted Catbirds, Wompoo Pigeons. At 08.05 I take the south trail but encounter leeches (due to the unseasonable humidity) rather than Cassowaries. Later I meet with a German couple who saw a male Cassowary with chicks at the picnic site. While driving the South Mission beach – Tully Rd near the Licuala State forest entrance a Cassowary is seen feeding in bright sun light on the grass verge. The huge bird retreats unfortunately in the rainforest when four excited tourists jump out of their car to take snapshots. Birding this lowland rainforest was rewarding, though often difficult and many bird sounds remained UFO's. Birds that could be identified included Pacific Baza, Red-necked Crake, Forest Kingfisher, Brown Cuckoo-dove, Wompoo Pigeon (several, also seen), Chowchilla, Little Shrike Thrush (common), Noisy Pitta, Masked Monarch, Lemon-bellied Flycatcher, Eastern Whipbird, Spotted Catbird (common), 3 Satin Bowerbirds and Victorian Riflebird.

Lodges, accommodation and bird information

Kingfisher Lodge, Mt Kooyong Rd., Julatten. Bunker sleeper, Au. \$20 per night (apartments and camp sites available as well). At present run by Ron and Susanne Stannard, phone 07 40941263, Fax 07 4094 1466, E-mail stannard@tpgi.com.au. Ron has a lot of recent bird news. Several sites (e.g. Mt Molly cemetery) mentioned by De Boer (1994) had been deserted, but Ron gave good alternatives.

Kookaburra Lodge, Yungaburra, Au. \$65 per night, breakfast \$9.50. Lovely lodge, the owner provided valuable site information for Hastie swamp and Lake Barrine).

Andrew Moon Camping, Innisfail, next to Bruce Highway. Since I was not sure about accommodation in Mission Beach a camper (Au. \$15) was rented for one night. Later motels appeared to be plentiful in Mission Beach and vacancies were no problem.

Two field guides and four travel reports were used:

SIMPSON K., DAY N. & TRUSLER P. 1999. Field Guide to the birds of Australia. 5th revised ed., Penguin Books Australia Ltd., Ringwood pp. 1-400, Au. \$ 35.00.

SLATER P. & SLATER R. 1998. The Slater field guide to Australian birds. 2nd revised ed., Landsdowne Publishing Pty. Ltd., The Rocks pp. 1-344, Au. \$ 29.95.

BENSTEAD P. J. & JEFFS C. J. S. 1990. Australia 88/89. DBTRS, Groningen.

DE BOER M. 1994. A birding travel report about Australia: Queensland, Northern Territory and New South Wales. DBTRS, Groningen.

ENTWISTLE M. 1987. 600+: A birders guide to Australia. DBTRS, Groningen.

HARRISON K. K. 1990. Australia1989: selective updates and new sites. DBTRS, Groningen.

Systematic List of birds observed between 22-8 and 04-9-1999

B=2-10; C=11-100; H=heard; n=nest; pr = pair; MC = Michaelmas Cay	Cairns	Dain- tree Forest	King- fisher Lodge	Mt Car- bine	Mt Molloy	Lake Mit- chell	Lake Bar- rine	Hastie Swamp	Ather- ton	Mis- sion Beach
Southern Cassowary	1	.	.	2 + 1
Australasian Grebe	15+	.	14+	.	.
Brown Booby (MC)	150
Australian Pelican	28+	C
Darter	1	.	.	.	1	60+	B	.	.	.
Pied Cormorant	B
Little Pied Cormorant	.	.	.	B	.	80	1	C	.	.
Great Cormorant	1	.	.	1	.	3
Little Black Cormorant	.	.	.	B	.	15	9	+	.	.
Pacific Heron	B
White-faced Heron	6	1	.	.	1	B	.	1	.	.
Great Egret	B	.	.	.	2	B
Little Egret	10	7	.	.	.	B
Intermediate Egret	B	B	.	.	1	+	.	+	.	.
Eastern Reef Egret	2
Cattle Egret	.	40	.	.	2	C
Striated Heron	1
Glossy ibis	15
Australian White Ibis	160+	.	B	+	+	+	.	5+	.	.
Straw-necked Ibis	C	B	B	10	B	80+
Royal Spoonbill	4	B
Yellow-billed Spoonbill	B
Black-necked Stork	1pr	.	1pr	.	.
Magpie Goose	10	.	.	12	.	C	.	600	.	.
Wandering Whistling Duck	2	6	.	.
Plumed Whistling Duck	400	.	.
Black Swan	2
Radjah Shelduck	C
Pacific Black Duck	80+	104+	1	150	.	.
Pink-eared Duck	5	.	.
Hardhead	7	12	13	.	.
Osprey	5
Black-shouldered Kite	2	1	1	1	1
Black Kite	7	33	2	.	1	2	.	7	3	24
Whistling Kite	.	1	.	.	.	1	.	1pr	.	1
Brahminy Kite	1	1

B=2-10; C=11-100; H=heard; n=nest; pr = pair; MC = Michaelmas Cay	Cairns	Dain- tree Forest	King- fisher Lodge	Mt Car- bine	Mt Molloy	Lake Mit- chell	Lake Bar- rine	Hastie Swamp	Ather- ton	Mis- sion Beach
Swamp Harrier	1	2	.	.
Spotted Harrier	.	.	.	1m
Pacific Baza/Crested hawk	1	1	.	.	.	1
White-bellied Sea-Eagle	1	1
Wedge-tailed Eagle	1,1	.
Brown Goshawk	1juv	.
Collared Sparrowhawk	1
Australian Hobby	1	1	.
Nankeen, Australian Kestrel	2	.	.	1	.	.	.	1	1	.
Australian Brush Turkey	1pr	.	6	.	.	.	6	.	3	.
Orange-footed Scrubfowl	1pr	B	4	B
Buff-banded Rail	3	.	.
Red-necked Crake	1
Dusky Moorhen	6	.	.	.
Eurasian Coot	.	.	.	150	.	.	1	1	.	.
Purple Swamphen	90	B	.
Australian Bustard	.	.	.	5
Brolga	1pr
Sarus Crane	6	32	6	.
Lesser Sand Plover	1
Greater Sand Plover	3
Red-capped Plover	1
Black-fronted Dotterel	3
Masked Lapwing	C	.	.	.	B	C	.	C	B	B
Pacific Golden Plover	5+
Ruddy Turnstone (also MC)	B
Great knot	47
Red Knot	2
Sharp-tailed Sandpiper	7
Red-necked Stint	10	2
Eastern Curlew	B
Whimbrel	3
Black-tailed Godwit	1
Bar-tailed Godwit	4
Greenshank	1	3
Marsh Sandpiper	2
Terek Sandpiper	3
Common Sandpiper	2
Grey-tailed Tattler	8
Silver Gull (also MC)	75+	B

B=2-10; C=11-100; H=heard; n=nest; pr = pair; MC = Michaelmas Cay	Cairns	Dain- tree Forest	King- fisher Lodge	Mt Car- bine	Mt Molloy	Lake Mit- chell	Lake Bar- rine	Hastie Swamp	Ather- ton	Mis- sion Beach
Whiskered Tern	2
Caspian Tern	1
Gull-billed Tern	15+
Black-naped Tern (MC)	80
Sooty Tern (MC)	4000
Bridled Tern (MC)	3+
Crested Tern (MC)	610
Common Noddy (MC)	3000
Black Noddy (MC)	3+
Wompoo Fruit-Dove	.	2	2	B
Pied Imperial-Pigeon	B	1pr
Topknot Pigeon	.	.	3	1
Feral Pigeon	B
Spotted Turtle-Dove	+	+	.
Brown Cuckoo-Dove	1
Peaceful Dove	+	+	+	+
Bar-shouldered Dove	.	+	+
Emerald Dove	.	.	+
Galah	.	.	.	45	20	.	.	10	.	.
Sulphur-crested Cockatoo	B	B	C	.	B	220	B	B	B	+
Rainbow-Lorikeet	E	D	C	+	+	+	+	+	+	+
Scaly Breasted Lorikeet	C	.	B	6	.
Double-eyed Fig-Parrot	.	.	2
Red-winged Parrot	.	.	.	2
Crimson Rosella	B	.	B	B	.
Pale-headed Rosella	2
Black-eared Cuckoo	.	.	.	1
Pheasant Coucal	.	.	.	1	1	1dead
Lesser Sooty Owl	.	.	1
White-rumped Swiftlet	C	B	25	.
Laughing Kookaburra	.	B	B	B	B	.	B	B	B	B
Blue-winged Kookaburra	.	.	1	.	1
Forest Kingfisher	B	.	B	.	B	.	1	.	.	2
Sacred Kingfisher	3	2	.	.	.	2	.	.	.	H
Collared Kingfisher	1pr
Rainbow Bee-eater	B	.	B	B	B	B	.	.	.	B
Varied thriller	1
Noisy Pitta	.	5	2
Welcome Swallow	+	+	.	1
Tree Martin	30+	+

B=2-10; C=11-100; H=heard; n=nest; pr = pair; MC = Michaelmas Cay	Cairns	Dain- tree Forest	King- fisher Lodge	Mt Car- bine	Mt Molloy	Lake Mit- chell	Lake Bar- rine	Hastie Swamp	Ather- ton	Mis- sion Beach
Fairy martin	10
Richard's Pipit	1
Black-faced Cuckoo-shrike	.	.	.	B	.	.	.	B	B	B
White-bellied Cuckoo-shrike	B
Lemon-bellied Flycatcher	1
Grey-headed Robin	.	.	3	1	.
Pale -yellow Robin	.	2	3
Little Shrike-thrush	.	3?	2	B
Bower's Shrike-thrush	1	.	1
Golden Whistler	1	.	.	.
Rufous Whistler	.	.	1
Leaden Flycatcher	1
Grey Fantail	1	1	.
Rufous Fantail	.	.	1
Willie Wagtail	+	+	+	.	+	.	.	.	+	.
Chowchilla	1	.	.	H
Eastern Whipbird	H	.	H	H
Grey-crowned Babbler	15
Shining Flycatcher	1pr
Spectacled Monarch	1m	.	4	2
Pied Monarch	1	.	.	.
White-eared Monarch	1
Golden-headed Cisticola	.	.	.	1
Tawny Grassbird	.	.	.	1
Little Grassbird	1	.	.
Lovely Fairy-Wren	1
Red-backed Fairy-Wren	.	.	1pr
Large-billed Scrubwren	.	.	1
Yellow-throated Scrubwren	1	.	.	.
Mangrove Gerygone	1
Large-billed Gerygone	.	B+n
Weebill	.	H	B	H
Helmeted Friarbird	C	P. Douglas
Noisy Friarbird	.	.	.	B	C
Little Friarbird	.	.	.	+	C	1
Blue-faced Honeyeater	.	.	B	.	C
Macleay's Honeyeater	.	C	B
Lewin's Honeyeater	.	C	B	.	B
Yellow-spotted Honeyeater	1
Graceful Honeyeater	.	.	B	C

B=2-10; C=11-100; H=heard; n=nest; pr = pair; MC = Michaelmas Cay	Cairns	Dain- tree Forest	King- fisher Lodge	Mt Car- bine	Mt Molloy	Lake Mit- chell	Lake Bar- rine	Hastie Swamp	Ather- ton	Mis- sion Beach
Bridled Honeyeater	.	.	1	1	.
Varied Honeyeater	C	H	.	.	.
Yellow Honeyeater	3	.	.	.	1
White-gaped Honeyeater	B
White-throated Honeyeater	.	.	C	.	B
Brown Honeyeater	1
Brown-backed Honeyeater	+	+
Scarlet Honeyeater	3+	.
Dusky Honeyeater	.	pr+j	B
Yellow-bellied Sunbird	B	B, 3n	.	1	B	.	1	.	B	.
Mistletoebird	2	3	H
Striated Pardalote	B
Red-browed Finch	.	.	C
Nutmeg Mannikin	C
Chestnut-breasted Mannikin	17
Crimson Finch	B
House Sparrow	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.
Metallic Starling	20	40	25	C, n
Common Starling	Brisbane & Melbourne Airport (breeding)									
Common Myna	+	+	+	+	+	.	.	.	+	.
Yellow oriole	B	B	B	.	B	B
Olive-backed Oriole	B	.	B	B
Figbird	C	C	C	.	B	.	.	.	C	C
Spangled Drongo	B	B	+	B	.	.	.	+	+	+
Satin Bowerbird	2+
Great Bowerbird	3
Spotted Catbird	.	.	B	.	.	.	2	.	.	B
Victoria's Riflebird	.	4+1m	3 (1f)	.	.	2
Magpie-Lark	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+
White-breasted Woodswallow	C	C
Black Butcherbird	B
Pied Butcherbird	.	B	.	B	.	1
Australian Magpie	.	.	B	C
Pied Currawong	B	+	7	C	.
Torresian Crow	Brisbane Airport			80	.	2	.	.	.	+
Little Raven	Melbourne Airport		

17-Jul-99, Begoniastr. 31, 4645 CA Putte, The Netherlands, hidde.bult@home.nl

Australië

1 – 27 augustus 2001

Reis naar Sydney en omgeving in New South Wales (NSW), naar Cairns en noord Queensland (Qld) en naar Melbourne en noordwest Victoria door Wouter en Hidde Bult.

Sydney en NSW

Verbleven in Park Lodge Hotel (82 Australische dollar (AUD) per nacht voor een tweepersoonskamer, tel + 61 (0)2 9318 2393) en in Royal Sovereign Hotel (66 AUD per nacht voor twee personen, Darlinghurst Road, Kings Cross, (0)2 9331 3672). Van 5-8 tot 10-8 een auto gehuurd: 370 AUD voor zes dagen, Value car rental, 720 km afgelegd.

Royal Botanic Gardens.

Bezocht op 3-8, 4-8 en 11-8. Veel algemene parkvogels (o.a. Buff-banded Rail, Noisy Miner, Superb Fairy-wren) en de collectie zwart-witte vogels (Pied Currawong, Australian Raven, Magpie-lark, Willie Wagtail en Australian Sacred Ibis) die overal in Australië opduikt. Van de laatste een grote kolonie, evenals van Vliegende honden in hoge bomen tussen de fameuze, jonge Wollemi Pine en de city. Verder o.m. een paar jagende Slechtvalken (ergens op een wolkenkrabber broedend?).

Manly Beach

Geliefde badplaats met zandstrand op noordelijk schiereiland dat toegang tot haven van Sydney vormt. Op 4-8 bezocht met veerboot vanaf Circular Quay. De overtocht biedt imposante uitzichten op Sydney harbour. Leuke wandeling naar zuidpunt van het schiereiland levert weer een jagende Slechtvalk op, die een Rainbow Lorikeet verschalkt, en de eerste Australische Torenvalken en White-browed Scrub-wrens. Hoewel het bijna windstil is toch wat zeevogels: Pied & Great Cormorant, Australische Pelikaan, Australische Jan van Gent, Fluttering Shearwater en Oostelijke Rirfeiger (grijze fase).

Pelagische trip

Op 11-8 met taxi vanuit Kings Cross (15 min, 30 AUD) naar Rose Bay Public Wharf. Aanwezig om 6.30, vertrek met Halicat (75 AUD pp) om 7.10. Zo'n 20 vogelaars, waaronder vier Engelsen en twee andere Nederlanders (Bert Pieters uit Enschede, Roland van der Vliet). In twee uur vaart de snelle katamaran naar de rand van het continentaal plat, waar koud antarctische water mengt met warmer continentaal water. In tegenstelling tot Zuid-Afrika, waar enorme trawlers wolven zeevogels aantrekken, hier geen commerciële visserij. Daardoor is zelf het zoeken naar goede vogelplekken. Gezien: Dwergpinguïn, Grote Albatros 2, Wenkbrauwalbatros 5, Yellow-nosed Albatross 2, White-headed Petrel = White-faced Storm Petrel = Bont Stormvogeltje, Providence Petrel 17+, Fairy Prion 8+, Fluttering Shearwater 18+, Australische Jan van Gent 12+, Australische Pelikaan, Kuifstern 12+ en 2 x Noordse Stern (een zeldzame gast in de wateren van Sydney!). Veel Zuidelijke Grienden (Pilot Whales), grote kudde (30+) en zeer nabij Common Dolphin (5+). Veel van dit fraais werd als eerst door Larry, een lokale vogelaar ontdekt. Daarna besluit de boot de walvissen of de zwemmende vogels, of blijf liggen om de rondvliegende albatrossen goed te kunnen bekijken. Oceaanvogels zijn vaak schitterend van nabij te bekijken. De lokale vogelaars vinden het echter een petdag, in deze tijd (augustus = winter) zouden de aantallen 10 tot

30 x hoger moeten liggen. Het zeewater zou al maanden te warm zijn. De afgelopen dagen overheersten bovendien ongunstige NW stormen; normaal is er in deze tijd een ZO passaatwind, die veel gunstiger is. Er wordt weliswaar "gescrumd" (onwelriekende visolie wordt op water gesprend), maar omdat het vandaag vrijwel windstil is, wordt de geur nauwelijks verspreid en komen weinig zeevogels op de vissoep af. Na terugkeer in Sydney (15.30) nog even met taxi naar Royal Botanic Gardens voor een vergeefse zoektocht naar Tawny Frogmouth. Alan Leishman, die in het kantoor van de tuinen werkt en exact de rustplaats kan aanwijzen, is alleen op werkdagen present. Wel weer Buff-banded Rail en Superb Fairy-wren.

Royal National Park

Bezocht op 5-8 met huurauto Het eerste reservaat (10 AUD per auto) dat we bezoeken, erg mooi, slechts 36 km ten zuiden van Sydney. Gesticht in 1879 en daarmee het op één na oudste ter wereld. Drie verschillende habitats bezocht. Allereerst rivierbegeleidend bos bij Audley. Daar bij de picknickplaats met kiosk o.m. Australian Wood Duck (Maneneend), Azure Kingfisher 2 en de eerste bombastische Yellow-tailed Black Cockatoos 12+. Het grootste deel van het park bestaat uit zandsteenplateaus bedekt met heath ("heide"). Deze vegetatie is 50 tot 150cm hoog en bestaat uit tientallen soorten stuiken (Banksia's, Tea-tree's). De meeste soorten bloeien in de winter en het vroege voorjaar (juli tot oktober), wat erg mooi is. De typische vogels voor deze habitat zijn vaak "skulkers" en moeilijk waar te nemen. Beautiful Firetail en Tawny Crowned Honeyeater laten zich toch zien tijdens een korte wandeling over de Curra moors vanaf de Wattamolla Road Bertram Seevers Drive. De Boy Martin Point Lookout bij Wattamolla, waar we picknicken, levert o.m. Grote Piepers (met jongen) en de 1^e Eastern Spinebill, Yellow thornbills, Brush Wattlebirds en White-breasted Sea-eagle op. In juni en juli is dit een goed punt voor noordwaarts trekkende walvissen, nu zien we alleen Aus. Pelikaan 2, Aus. Jan van Gent ad en onv. en Kuifsterns passeren. Langzaam slaat het weer om en bij een wandeling door de derde habitat (subtropisch regenwoud met veel boomvarens, vanaf de Lady Wakehurst Drive naar de Bola Picnick plaats) raakt het zwaar betrokken. Crimson Rosella, Large-billed en White-browed Scrubwren laten zich zien, en Eastern Whipbirds (waarvan ik me de roep uit 1998 herinner) zijn te horen. Zoals vaak in regenwoud blijven veel geluiden voorlopig UFO's. Achteraf bleken dit onder meer Superb Lyrebird en Fan-tailed Cuckoo geweest te zijn. Daarna rijden we langs de industriestad Wollongong naar Kiama, waar we om 17.10 aankomen, op het moment dat de zon ondergaat. We huren voor twee nachten een "twin bed room" in het lokale hostel (39 AUD per nacht).

Barren Grounds en omgeving

Kiama

Op 6-8 eerst de beide spuitgaten ("blow pipes") bezocht. T.g.v. de harde NW wind spuiten ze nog geen 2 meter hoog, 60 m zou voor de grote bij een gunstige combinatie van getij en wind haalbaar moeten zijn! Al doende zien we aan de

kust o.m. Witbuikzeearend (White-bellied Sea-eagle), Aus. Torenvalk, Aus. Pelikaan, White-faced Heron, Sooty Oystercatcher (2) en Oostelijke Rifreiger. In de omgeving onder meer Buff-rumped Thornbill, Silvereye, Grey Fantail, Figbird en veel immigranten uit Europa (Putter, Huismus, Spreeuw) en India (Red-whiskered Bulbul, Common Myna) die door kolonisten zijn ingevoerd in Australië. Bij de standaardverzameling zwart-witte vogels voegen zich Little Pied Cormorant en Straw-necked Ibis.

Barren Grounds

Op 6-8 bezocht, weinig bewolkt, 7°C. Een keiharde, ijzig koude WNW mistral (kracht 7-8, bleef aanhouden tot 9 augustus !) houdt vogels in dekking en overstemt elk (vogel)geluid. Als we over de mooie Griffiths trail wandelen vinden we al snel (500 m richting ZO vanaf picknickplaats) een vers geplukte Ground Parrot (Grondpapegaai). Deze specialiteit van Barren Grounds komt alleen voor op een klein aantal open "heaths" langs de ZO kust van Australië. Wat verder, bij de "Saddleback trig" ontdekt Wouter een levende die de storm trotseert en als een speer over de "heide" scheert. Schitterend. Op beschutte plaatsen veel Chestnut-rumped Heathwrens, New-Holland Honeyeaters, Eastern Spinebills en formidabele waarnemingen van de Yellow-tailed Black Cockatoos. Een flits van een Eastern Bristlebird in het struikgewas duurt te kort om hem als zeker te noteren. In de hoop dat de wind 's avonds gaat liggen keren we tegen zonsondergang terug naar de beste plaatsen aan beide zijden van de picknickplaats. Helaas blijkt onze hoop ijdel: tot in de late schemer wordt elk geluid overstemd en blijven skulkers als Ground Parrot, Southern Emu Wren of Bristlebird onhoorbaar en dus onvindbaar in het grootse landschap.

Blue Mountains

Omgeving Katoomba / Blackheath.

Prachtige landschappen, spectaculaire wandelingen langs afgronden met adembenemende vergezichten, o.a. op The Three sisters (één van de beeldmerken van NSW en Australië). We logeren drie nachten in Katoomba (twin room 48 AUD per nacht). Van daaruit maken we stevige (Grand Canyon Tour) tot zware (Overcliff / Undercliff / Valley of the waters) wandelingen. Vanwege de hoogte (950-1050 meter) is het hier veel frisser dan in Sydney. We bleven daarom veel in de luwte i.v.m. de ijzige, snijdende wind en de lage temperatuur (2-6°C). Gezien o.a. Aus. King Parrot (in klein aantal op alle plaatsen met subtropisch regenwoud, vooral tegen de avond) en Liervogel. De eerste Liervogel 300 meter vanaf Evans lookout aan het begin van de Grand Canyon Walk, samen met een Pilotbird ("Loodsvogel"). Daar ook door anderen opgemerkt. Te vinden op vrij vlakke plaatsen waar een los dek van (Eucalyptus)bladeren omgewroet is. Meer Liervogels tegen de avond (en waarschijnlijk ook in de vroege morgen) in het subtropische regenwoud langs de weg met haarspelden ten N. en ten Z. van Mermaids Cave aan de W zijde van de Great Western Highway, net buiten Blackheath. Door het geaccidenteerde terrein zijn ze daar moeilijk te zien. De zeldzame en erg lokaal voorkomende Rock Warbler (Origma) was een vaste prik op het muurtje van de parkeerplaats bij Govetts Leap Lookout (Blackheath).

Euroka Clearing (Glenbrook)

Aan de O. zijde van de Blue Mountains, 1.5 uur vanaf Sydney. Geheel ander biotoop: golvende grasvelden omgeven door bos op vulkanisch as. De grasmat wordt

gemillimeterd door dozijnen Oostelijke Grijze Kangaroes. Veel (handtamme) vogels op de picknickplaats, waaronder een man Satin Bowerbird.

Noord Queensland (Qld)

Met zes en een halve dag was het aantal dagen voor Queensland helaas twee minder dan oorspronkelijk gepland. Dat kwam omdat we graag de oceaantrip vanuit Sydney wilden meemaken. Het Qld programma werd ingekort door het laaglandregenwoud bij Mission beach (met grote kans op Helmcasuaris, in september 1998 zag ik die op adembemend korte afstand) te schrappen en het bezoek aan de Atherton Tablelands te beperken tot 1 dag sightseeing met de auto.

Cairns

Esplanade

Bezocht op 12-08-01 (14.30-15.30, 16.30-18.00) en op 18-08-01 (17.10-18.10). Goed licht in late namiddag en avond, beste hoogwatervluchtplaatsen vlakbij het centrum van Cairns. Grote waadvogels (op 12-08 de 4 soorten "zilverreigers" en White-faced Heron bij elkaar), steltlopers en sterns (Lach-, Kuif of Reuzensterms) zijn altijd present. De aantallen en het soortenspectrum zijn echter sterk variabel: b.v. op 12-8 100 Grote Kanoeten en 40 Grey-tailed Tattlers, op 18-08 respectievelijk 0 en 110. Van beide soorten steeds alleen volwassen vogels, soms nog in broedkleed. Alleen van Siberische Strandloper en Roodnekstrandloper juveniele vogels gezien. Verder Black-fronted Dotterel, Visarend, Witbuikzeearend en alweer een Slechtvalk, die een Myna verschalkt.

Centennial Park en Flecker Bot. Gardens.

In het Centennial park veel Noisy Friarbirds. Een vlonderpad ("board walk") leidt naar de botanische tuin door een fragment van het nogal zeldzame laaglandregenwoud (met bordjes, o.a. bij Strangler Fig en "Wait a while"). Dat is een kruipalm met messcherpe naalden. Als je vast raakt duurt het even voor je jezelf bevrijd hebt (vandaar de naam). Bezocht op 14-08-01, van 08.30 tot 09.30: uur. We zien in het regenwoud o. a. Black Butcherbird, de eerste Orange Scrubfowl en horen een Noisy Pitta ("walk to work").

Cairns Crocodile Farm

Bezocht op 18-08-01, 14.50-16.10, op aanraden van Ron Stannard. (Aus \$11.20). Ongeveer 1 uur rijden ten zuiden van het centrum van Cairns, afslag aan de oostzijde van de weg naar Innisfail. Hier worden zoutwater krokodillen gekweekt. Vogelrijk bijv. Rufous Night Heron, roofvogels (150 Zwarte Wouwen, Whistling Kite, Witbuikzeearend) en goed voor ijsvogels (o.a. Forest Kingfisher en 4 Little Kingfishers). De laatste is buiten de mangrovebossen langs de Daintree rivier een moeilijk te vinden soort in Qld), rallen (waarschijnlijk 1 Kleinst Waterhoen, maar te flitsend om als zeker te noteren, wel 6+ White-browed Crake, Purperkoeten), Yellow Oriole en prachtvinken (een paar Crimson Finches en 25 Chestnut-breasted Mannikins).

Skyrail

De skyrail is één van de langste gondelbanen ter wereld, speciaal aangelegd (met helikopters) om bezoekers een indruk van het regenwoud te geven. Op 14-08-01 om 10.55 gestart (45 AUD pp). De korte rondleiding met gids bij de 1^e halte bleek erg de moeite waard te zijn. Na de lunch een

wandeling door (de kermis van) Kuranda gemaakt en terug met Skyrail (niet met de trein) om 14.30.

Hoewel er weinig vogels te zien zijn, is de zweeftocht over de bloemkolen van het regenwoud een unieke, rustgevendende ervaring. Deze keer waren Ulysses Butterfly (een enorme blauwe vlinder), Sulphur Crested Cockatoo (die overal in Australië te zien is) en Metallic Starling de hoogtepunten. Na terugkeer op de begane grond rijden we naar Kingfisher park, waar we op tijd voor de traditionele Engelse theeceremonie aankomen. We huren een tweepersoonshut voor 4 nachten (48 AUD per nacht).

Groot Barrière Rif.

Op 13-8 bezocht met de "Sea Star II" (Aud 65 pp, vertrek van de Pier 08.10; terug 16.00 uur), Een stevige ZO bries (witte kopjes op zee), half bewolkt, in de ochtend enkele druppels. Tijdens de heen- en vooral tijdens de terugreis kreeg ¼ van de opvarenden last van zeeziekte. Wouter en ik hadden 12 en 1 uur voor vertrek preventief cinnerazine ingenomen en nergens last van.

Michaelmas cay ("Mikkulmas Kee")

Dit eilandje leek nog miniemer dan in 1998. Wouter gaat snorkelen in de luwte in de baai van het eiland, voor mij is het water te fris en ik bezoek de vogelkolonie. Er broeden Gewone Noddies, Bonte Sterns, Kuifsterns, "Silver" meeuwen en er rusten 150 Bruine Genten. Er zijn veel vliegvlugge, jonge Bonte Sterns, die hier een broedcyclus van 9 maanden hebben! Net als in 1998 vliegen aan de ZO kant van het eiland 12+ "Black-naped Terns", maar die worden onzichtbaar zodra ze neerstrijken. Evenmin als in 1998 kon ik Bengaalse Sterns (Lesser Crested Terns) ontdekken. Toen wel enkele Brilsterns en "Black Noddies". Bert Pieters ziet een dag later deze soorten evenmin en mist de Black-naped Terns, maar ziet wel Fregatvogels.

Hastings Reef

Wouter en ik besteden al onze tijd aan het snorkelen: dat was weer groots. Dit keer ging het "glass-bottom" bootje maar even de woeste baren op en kon blijkbaar lang niet iedereen mee. Het aantal deelnemers lag dan ook veel hoger dan in september 1998.

Kingfisherpark

Kingfisherpark biedt natuurliefhebbers een onderkomen in een fragment tropisch regenwoud, aan de voet van Mount Lewis. Aan de rand ligt een kleine, besloten boomgaard met verschillende soorten exotische en nogal vreemde fruitbomen. Daarlangs ruist een kraakheldere beek ("creek" in het Australisch). Je kan er kamperen, eenvoudige hutten (cabins met 2 bunks = slaapkisten) huren of in luxueuzere appartementen (lodges) met ontbijt op bed overnachten. De beheerders Ron en Sue Stannard hadden dit keer versterking gekregen van een koppel Engelse vogelaars (Andrew en Carol Iles). Die trachten als "free lance" gidsen hun kostje te verdienen, wat ze redelijk lukte.

De fameuze Red-necked Crake, een ral uit hooglandregenwoud die 's winters afdaalt naar het Kingfisherpark, vertoonde zich iedere dag vanaf theetijd tot de avond bij de voerplaatsen naast de veranda. Daar kwiekte het van de Red-bowed Finches en de Emerald Doves en er scharrelen Orange-footed Scrubfowls en Boskalkoenen (Brush-turkeys). Beide zijn grootpoothoenders of "megapoden" uit NO Australië, die hun legsel door de warmte van rottende composthoppen laten uitbroeden. Het

kostte soms moeite om niet te struikelen over de handtamme Red-legged Pademelon. Dat is een minieme kangaroo, die randzones van Australische regenwouden bewoont. Helaas was dit de laatste Pademelon. In 1998 zag ik er verschillende, evenals "Agile Wallibi's", een middelgrote kangaroo. Ook de Agile Wallibi's waren in drie jaar tijd door een onbekende oorzaak uitgestorven. De verdenking bestond dat ze vergiftigd waren bij campagnes tegen de "Cane rat", een knaagdier dat de suikerrietvelden teistert. Dankzij forse subsidies van de overheid rukken suikerrietplantages enorm op in Queensland. Ze ruïneren het ecosysteem op dezelfde schaal als de maïsteelt in de Benelux. Op 17-8 verraste ik bij zonsopgang wel een Wallaroo, een zwaar gespierde, forse kangaroo, die zich met veel geweld, lawaai en gespat door de beek aan de grens van de boomgaard uit de voeten maakte.

De Orchard in Kingfisher park

Het vogelbekdier was gelukkig wel nog altijd present in de beek achter de boomgaard aan de W-grens van Kingfisher park. Vertoont zicht juist vóór zonsopgang en net na zons- ondergang, of 's nachts met zoeklicht. Op 14-08 1 een vrij fors exemplaar - wat nog altijd verrassend klein is - langdurig voedselzoekend van 18.10 tot 18.15. Op 16-08 even zien zwemmen rond 18.20 voor hij verdween tussen de bakstenen en het puin onder een waterpomp, waar mogelijk een broedhol is. Zowel in 1998 als in 2001 's avonds steeds vanaf links komend, tegen de stroom opzwevend. Volmaakte stilte is geboden.

Dit keer in de winter (augustus) andere vogels dan vorige keer (september 1998). Onder andere een vrouw Victoria's Riflebird, één van de drie soorten paradijsvogels uit de Australische regenwouden, 2-3 Noissy Pitta's en Bassian Thrush waren hier nieuw voor mij en formidabel te bekijken. In september wel veel meer bloeiende Bottlebrushes en Eucalyptussen. Als daar de ochtendzon op schijnt, komt er een bonte parade kleurrijke Honey-eaters op af. Verder droegen in augustus de reusachtige vijgenbomen rond de boomgaard nog weinig vruchten. Daarom afgezien van Rainbow Lorikeet, Figbird en Topknot Pigeon nu geen andere fruitsnoepers (Fig-parrot, Whompoo duif), die in september 1998 wel op het menu stonden.

Wouter en ik maken de 1^e ochtend (15-08-01) een excursie onder leiding van Andrew (7.00 – 9.30 uur, AUD 20 pp; beperkt aantal deelnemers). Dat was erg geslaagd: we zagen ruim 40 vogelsoorten en hoorden nog een dozijn andere. Dat is twee maal meer dan je op eigen houtje ontdekt, zeker bij een 1^e ochtendwandeling. Al doende leerden we ook heel wat basisgeluiden kennen.

Het nachtleven van Kingfisher park.

Zodra het donker wordt kan je het melancholieke geluid van Bush Stone-curlew en gekrijs van (jonge) Kerkuilen verwachten. Bijna iedere nacht was de Lesser Sooty Owl te horen: een scherpe, dalende fluittoon, die doet denken aan een vallende bom (of vuurpijl). Dit kan tot de vroege schemer duren, waarna de uitzinnig lachende Kookkaburra's het klankspel voortzetten.

Op 15-08 maakten we een nachtwandeling met schijnwerpers o.l.v. Andrew en Carol (AUD 15 pp). In de zoeklichten duiken naast vijf zoogdieren Lesser Sooty Owl en Kerkuil op, evenals Gekko's en formidabele Spinnen. Spot lighting" bleek ook vrij goed te gaan met een normale zaklamp. Houd de lamp zo vlak voor je neus (of je ogen),

dan heb je meer kans om de weerkaatsing van onbekende ogen die je in het donker aanstaren op te vangen.

Mount Molloy

De Grote Prieelvogel ("Great Bowerbird") stal de show bij Fraser Road aan de oostzijde van de basisschool. Overal priëlen in wat rommelige struiken op het grasveld tussen het hoofgebouw en een wrakkig schuurtje. Toestemming gevraagd aan de directeur, die ons meteen meetroont naar het meest recente bouwwerk van de vogel. Helaas vergeten foto's te maken: elk prieel was versierd met tientallen slakkenhuizen en andere witte voorwerpen. Voor de directeur was het geen probleem dat we achterblijven om de vogel op te wachten. We krijgen de bouwmeester zelf maar matig in de kijker. Daarom bezoeken we later het grasveld met verspreide bomen tussen het gemeenschapscentrum (aan de hoofdweg), de kerk en het politiebureau (aan de Fraser Road), waar er in september 1988 flink wat bivakkeerden. Ook nu krijgen we alras een zestal Grote Prieelvogels heel goed te zien.

Mount Lewis

Onderdeel van Daintree Forest National park dat goed toegankelijk is in droge tijden. Karakteristieke vogelsoorten voor hooglandregenwoud, als Gouden Prieelvogel, zijn aanwezig. Een prieel ("bower") van de Gouden Prieelvogel is eenvoudig te vinden, bezocht op 18-08. Vanuit Kingfisher park met de auto naar noord (Mossman) en dan de eerste afslag naar links (Mt Lewis Road) langs de tavernen. Bij de splitsing links aanhouden. Na de beek ("creek") passeer je rechts coniferen en gaat de weg over in een onverharde piste en begint sterk te stijgen. In september 1998 was ik hier gestopt omdat het zwaar regende en de weg het karakter van een bergbeek kreeg. Na enige tijd volgt links een bord "Mt. Lewis National Forest". Na aanhoudend stijgen bereik je op exact 12,9 km van Kingfisher park het eerste vlakkere deel met een open plek. De meeste ruimte is rechts van de weg, er is juist genoeg ruimte om de auto te keren en te parkeren. Als we nog wat verder rijden bereiken we na ± 400 meter een houten hek. Dat staat weliswaar open maar een "ranger" laat ons horen dat daarachter het bos zonder vergunning niet toegankelijk is en dat er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.

Vanaf de open plek, waar 's zomers Blue-faced Finches te zien zijn (maar helaas nooit in augustus volgens Andrew), voert links (richting ZZW, iets schuin) een verhard pad het regenwoud in. Blijkbaar leven hier nog Helmcasuarissen. Na ± 300 m vinden we namelijk de karakteristieke uitwerpselen: een verzameling halfverteerde, tropische vruchten op het pad. De uitwerpselen lijken echter langer dan een dag oud. Op ± 1.5 km vanaf de open plek splitst dit pad, we slaan linksaf. Juist voor we tegen een flink waterservoir aanlopen, gaat links een paadje omhoog naar het prieel in regenwoud (30-50 m vanaf het verharde pad). Als je dit kleine paadje in eerste instantie mist, pas je vanaf het waterservoir 50-70 m af.

Bij het prieel van de Gouden Prieelvogel lopen we Carol tegen het lijf, die een Brits - Nieuw Zeelands koppel rondleidt. Zij deden een dag eerder een vergeefse poging te voet, omdat ze de "piste" te gewaagd vonden voor hun huurauto. Carol zegt dat we ons verdekt op 25-30 m van de bower moeten opstellen. Als je te dicht bij het prieel (de "bower") blijft durft de vogel zich niet te vertonen. Waarschijnlijk is dat de reden waarom onze poging gisteren (bij Crater Park) niet lukte. Al snel komt de man Gouden

Prieelvogel nieuwsgierig te voorschijn en laat zich fantasieus bekijken. Zijn mechanisch eindigende zang is al even bizar als het prieel. Dat bestaat uit twee torens van ongelijke hoogte, die samengesteld zijn uit kleine takjes, gevlochten rond twee iele stammetjes. De top van elke "twin tower" is minutieus versierd met grijswitte plukjes korstmoss.

Tijdens de heen- en terugwandeling noteren we Victoria's Riflebird (4 ex, scherp, doordringend en onaangenaam "yaas", als super vlaamse gaai), Spotted Catbird (katachtige mauw), Tooth-billed Catbird (luide mimicry), Bassian Thrush (2 ex, rijke lijsterzang, sterk afwijkend van de armzalige fluittoon van de Goudlijster), Eastern Whipbird (Zweepvogel) op verschillende plaatsen. Een paar Zweepvogels zingt een duet bestaande uit een aanzwellend gefluit dat eindigt in formidabele zweepsplag. Verder kleiner gesuis dat typisch is voor hoger regenwoud. Onze tijd was erg beperkt, als je hier langer rondwandelt, ontdek je vast nog meer. Als je nieuw bent en de geluiden niet kent zie je weinig van dit fraais.

Lake Mitchell

Vogelrijk meer rechts van de weg naar Mareeba, bezocht op 15-8 en even op 17-8 bij zonsondergang. Drie goede plaatsen. Gerekend vanaf de N-zijde eerst een landtongetje / strandje ("spit") waar steevast Lepelaars, aalscholvers, ibissen en Pelikanen en steltlopers te zien zijn. Links een onverharde weg, daartegenover (=meerzijde) kan je parkeren onder enkele bomen. De auto staat dan in de schaduw en uit het zicht. Officieel mag je niet over het hek klimmen om naar de oever en de grasvlakte, waar paarden grazen, te wandelen, maar tot nu toe heeft nog nooit iemand daarvan iets gezegd.

De tweede plaats is enkele honderden meters verder richting zuid, waar rechts een parkeerplaats is bij een greppel / sloot met rijkere begroeiing. Vandaar heb je een mooi overzicht over het water en de zuidoostoever. Op die oever liep in september 98 steeds een Jabiru en er lag een goed zichtbaar nest van een paar Brolga's. Beide soorten ontbraken dit jaar, mogelijk waren ze uitgeweken naar de "Mareeba Wetlands".

Als je nog verder zuidwaarts rijdt, wijkt de weg van het meer. Dan de eerste onverharde weg rechts inslaan. Open het hek en rijd of wandel naar het westen over een dam, die het meer doorkruist en naar een brug bij de heuvels gaat. Links veel dode bomen met een groot nest (Witbuikzeearend?). Deze weg is openbaar, het hek moet de paarden tegenhouden. Wouter en ik hebben er 2 uur aangenaam gewandeld en gezeten.

Mareeba Wetlands

Zo'n 20 km ten N. van Mareeba aan de Pickford Road, ten W. van de hoofdweg. Door ons niet bezocht, heb de richtingwijzer wel gezien. Een natuurontwikkelingsproject dat een bezoek waard is volgens onbekende vogelaar uit Cairns. Mensen die we in Kingfisher park spraken zagen er Brolga en Jabiru.

East Mary Road

Vanuit Kingfisher park naar het zuiden en voor Mount Molloy rechts afslaan richting Mount Carbine (en Cooktown). Voor Mount Carbine bereik je een open, grazige vlakte. Daar rechts de East Mary Road inrijden. Al snel zagen we links en rechts Australian Bustards, die weinig schuw waren. Op 17-08 twee paraderende hanen met enorme keelzakken van losse veren en enkele onvolwassen

hanen en vrouwtjes. Anderen zagen er een dag eerder 30+. West Mary Road en Carbine Dam zijn eveneens de moeite waard, maar dit jaar was er onvoldoende tijd voor een bezoek.

Daintree rivier

Boottocht gemaakt op 14-8 voor crocs (Zeekrokodillen) en mangrovespecialiteiten. We zien o.m. Papuan Frogmouth (1 paar, schitterend, ik was er erg mee in mijn nopjes; door hun plaatstrouw is succes 100% zeker), Azure en Little Kingfisher en Jabiru op nest. Wij gingen met Peter Cooper, bijgenaamd de "Mangrove man". Prijs 40 AUD pp voor 2 uur in een bootje met maximaal 6 personen. Hij vertelde zo enthousiast over de vele mangroves dat de reis flink wat langer duurde.

De beste vogeltocht (Chris Dahlberg) was volgeboekt tot ver na ons vertrek uit Cairns. In september zie je met hem zo goed als zeker Pied Imperial Pigeon en Shining flycatcher (naast de soorten die wij ook zagen) en heb je gerede (50+%) kans op Great-billed Heron. Prijs onbekend, vertrek om 06.00 uur. Vanuit Kingfisher park is Daintree ruim een uur rijden.

Mossman Gorge

Leuke rondwandeling door laagland regenwoud in het Daintree forest met spectaculaire hangbrug en mooie stroomversnellingen. Die overstemmen soms wel de vogelgeluiden. In augustus slechts enkele roepende Victorian Riflebirds en nauwelijks Noissy Pitta's. In september zijn die soorten eenvoudiger op te sporen. Dit keer wel heel mooi en langdurig een man Victorian Riflebird met opgeheven vleugels in baltshouding zien zitten.

Atherton Tablelands

"Sightseeing" op 17-8, daardoor weinig tijd buiten de auto, maar toch nog flink wat vogels gezien.

Hastie Swamp

Aan de Herberton Atherton Road, eerste (?) afslag naar het oosten in, kruist zeer snel de spoorweg. Daarna rechts afslaan. Was net als in 1998 weer vogelrijk. Picknick op de 2e verdieping van de kersverse observatietoren met een riant uitzicht, goed licht en dicht bij vogels. Een onvolwassen Witbuikzeearend verzorgt een grootse vliegshow en zaait een enorme paniek onder de wolken Fluiteenden. Hij slaat een Ekstergans, maar laat die weer ontsnappen. Op de weg naar het zuiden Sarussen in de weilanden. Ze zoeken ook voedsel op pas geoogste suikerrietakkers en in de avond en bij zonsopgang zijn ze beter op te sporen.

Mount Hypipamee Natl. Park / The Craters.

Een verrassend diepe kraterpijp. Langs het pad vanaf de parkeerplaats zijn Atherton Scrubwrens goed te zien in de ondiepe grebbe, links van het pad, juist na het (enige) duobruggetje. Als je het pad volgt naar de watervallen goede kansen om epifyten, die vaak torenhoog zitten, op ooghoogte te fotograferen met redelijk licht. Zo'n 2 km naar het zuiden (Ravenshoe) bezoeken we een prieel van een Golden Bowerbird.

Lake Barrine

Een groot katermeer omsloten door een ring van regenwoud, waarin een goed onderhouden pad (6 km, rondwandeling) ligt. In Sydney hoorde ik van een Engelse vogelaar dat Henry, de laatste en eenzame mannelijke Helmcauaris, die

in 1998 nog fier bij de parkeerplaats paradeerde, inmiddels door een auto is overreden en jammerlijk is overleden. Dat lot treft veel Casuarissen in Noord Queensland, het is hun grootste bedreiging. We zijn het pad naar links (vanaf het theehuis) hooguit 1 km opgewandeld. Eerst passeren we na 80 meter de twee reusachtige Kauri pijnbomen. Vanaf daar nemen we binnen 400 m Mountain Thornbill, Victoria's Riflebird, Spotted Catbird, Tooth-billed Catbird en Whipbird waar. Dankzij de goede ogen van Wouter krijg ik die laatste eindelijk goed te zien.

Victoria en aangrenzend NSW

Aankomst in Melbourne op 19-8 (14.00), vertrek op 27-8 (18.00). Na één nacht in Melbourne (Nunnery, 70 AUD voor een twin room) huren we op 20-8 bij het vliegveld een Toyota Corolla (AVIS, 413 AUD voor 8 dagen kilometer vrij, uiteindelijk 2329 km afgelegd). Daarmee rijden we naar Rainbow ten zuiden van het Wyperfeld National Park. Daar boeken we een tweepersoonskamer in het enige motel, "The Pot of Gold" (57 AUD per nacht). De warme maaltijd in de lokale supermarkt is daarna erg smakelijk, de bediening vraagt zich af wat we in deze uit-hoek te zoeken hebben.

Wyperfeld National Park (NW Victoria)

Op 21-08 in alle vroegte naar Wyperfeld, zo'n 40 km tot het bezoekerscentrum. De hele dag komen we niemand tegen. Langs de toegangsweg een vijftigtal Emoe's, 2 Pink Cockatoo's, flink wat Westelijke Grijze Kangaroes en zowaar een Konijn. In de ochtend klaart op, maar het blijft guur. We wandelen over de Bambruk Nature trail door Heathland, open zandige stukken met grote pollen "Stekelvarkengras" en langs duinen. Een hoogtepunt in het "heidelandschap" is een prachtig zingende "Southern Scrub Robin". Die is met zijn grootte van een Zanglijster flink forser dan ik me had voorgesteld. Bij de terugweg naar het pad blijkt dat je hier snel de weg kunt kwijt raken. We zien verder "Fan-tailed Cuckoo", die opvalt door een luide, dalende triller, die iets in toonhoogte zakt en meestal tweemaal herhaald wordt. Tijdens de picknick legt Wouter een brutale "Australian Magpie" vast.

Daarna rijden we over de "Eastern Look-out Nature Drive" via een voormalige, droge rivierbedding naar Mallee vegetatie. Dit is een plantengemeenschap waarin een aantal lage (2-8m hoog) eucalyptussoorten domineren. Mallee bedekte ooit grote delen van Victoria en South Australia, maar het is nu bijna verdwenen omdat het – vooral op voedselrijke bodems – in cultuur is gebracht. Ook Mallee blijkt een vegetatie waarin het bijzonder moeilijk om je te oriënteren. Daarom volgen we een duidelijk pad met wegwijzers, de "Malleefowl Trail". Tijdens die wandeling laten "Shy Heathwren" en een "Hooded Robin" zich fraai bekijken. We vinden de geduchte broedhoop met krater ("mound") van de Thermometervogel ("Malleefowl") waarna het pad genoemd is. Het lukt helaas niet de vogels voor de kijker te krijgen.

Op de terugweg bezoeken we "Lake Alacutya". Dat blijkt een enorme, schaars begroeide droge vlakte te zijn, waarin nauwelijks een druppel water te ontdekken valt. Buiten Australische Boomvalk (donkere vorm), Australische Grijze Wouw en een "Singing Honey-eater" zien we niet zo veel. Het wordt donker, de hemel betreft en het gaat regenen. Daarom besluiten we de enige saloon van Rainbow op te zoeken, waar een warme kachel brandt.

Omdat we de Thermometervogels niet te zien kregen, keren we op 22-08 terug naar Wyperfeld. Dit keer hebben we wel geluk. Op enige afstand van de broedhoop ontdekken we bij toeval een foeragerend paar Thermometervogels. Ze laten zich goed bekijken. Andere leuke waarnemingen zijn Rose Kaketoos en Pallid Cuckoo langs de toegangsweg en Ringnekpapegaai (de malleevorm).

Om 10.40 vertrekken we en rijden via Hopetoun over binnenwegen naar het "oude" stadje Echuca aan de Murray Rivier. Bij Boort een zilte, ondiepe plas met Red-capped Plover, Steltkluut 40 en Roodhalskluut 40. Ten Noorden van de Murray beginnen weidegebieden waar Australische Grijze Wouw (dagtotaal meer dan 25) en Lang-snavelkaketoos algemeen voorkomen. Na een weinig inspirerende excursie bij Barnah huren we 's avonds een tweepersoonskamer in het Deniliquin Motel voor 66 AUD per nacht. Die dag 440 km per auto afgelegd.

Deniliquin (NSW)

Vanuit het motel wandel ik op 23-08 en 24-08 voor het ontbijt door het "Island Sanctuary" (6.40-8.00). In dit park aan de oevers van de Edward rivier broeden en overnachten enorme aantallen kaketoos, meest Galah en Langsnavel kaketoos, maar ook Geelkuifkaketoos. Met enorm gekrijs gaan ze vanaf zonsopgang in grote vluchten op zoek naar voedsel in weidegebieden in de omgeving. Op het eiland veel Oostelijke Grijze Kangaroes. Verder Rufous Nightheron, Common Bronzewing, White-winged Chough, Superb Fairywren, veel Yellow blue-cheeked Rosella's, Roodstuitpapegaaien, Grey Shrikethrush, Striated en Yellow Thornbill, Brown en White-throated Treecreeper, Red-bowed Firefinch, Grijze Currawong, Australian en Little Raven en flink wat immigranten: Stadsduif, Huismus en zingende Merels en Spreeuwen.

Na het ontbijt bezoeken we op 23-08 het museum over de regionale geschiedenis. Twee Merinoschappen vormen de pronkstukken. Dit ras is hier in het verleden door een lokale schapenboer in gefokt en deed daarna vanuit Deniliquin opgang in heel Australië en de rest het zuidelijk halfrond. De toeristendienst is blij met twee bezoekers en geeft folders met informatie over vogels en natuurgebieden in de regio. Een kort bezoek aan de rioolzuivering ("Sewerageponds") levert niet veel bijzonders op, afgezien van wat eenden, Straw-necked en Sacred Ibis, Little Eagle, Zwarte Wouw 2, Australian Kestrel 2 en Wigstaartarend 2. Daarom rijden we 25 km zuidwaarts naar het Gulpa woud, een staatsbos met uitgestrekte opstanden van rode gombomen langs de oevers van de Edward Rivier en de Gulpa Creek. Australische Grijze Taling 60, Muskuseend, Slangenhalsvogel, Geelbek-lepelaar, Blue Bonnet, Striated Pardalote, Brown Flycatcher, Diamond Firetail, Oostelijke Grijze Kangaroes 30+ en een uitheemse Vos laten zich zien. Het is landschappelijk mooi maar lijkt in dit seizoen weinig vogelrijk, omdat de zomervogels nog ontbreken en de standvogels veelal weinig territoriumactiviteit ontplooiën. Vandaar gaan we naar de Wangallah Swamps zo'n 40 km ten noorden van Deniliquin. Een mooi open steppengebied met verspreide, moeilijk toegankelijke moerassen en plassen. We zien er reigers, eenden, Swamp harrier 6+, Australische Torenvalk en ten minste vier Wigstaartarenden.

Via een avontuurlijke en onverharde piste door mooie graslanden met verspreide bosjes bereiken we de "Steamy plains". Van 16.40 tot zonsondergang blijven we op deze uitgestrekte prairies. Het landschap is extreem vlak en open

met enorme schapenranches. Die zijn zo uitgestrekt dat vaak mijlen in de omtrek geen teken van bebouwing te ontdekken is. Naast Black-faced Woodswallow, Wigstaartarend en Emoe vertonen zich Oostelijke Grijze Kangaroo 3, Rode Reuzenkangaroo 35+ en de enige Zwarte Valk van de reis.

We speuren de vlaktes af naar de "Plains-wanderer", een nachtvogel die alleen in Australië en dan ook nog heel lokaal voorkomt. Zonder (tips van) lokale gidsen is het zoeken naar een speld in een hooiberg op deze enorme vlaktes en daarom keren we om 19.00 terug in Deniliquin.

Deniliquin - Melbourne, 24-8-01.

Na ontbijt vertrek uit Deniliquin om 9.30 uur, via Echuca, Heathcote naar Melbourne. Onderweg onder andere een Bruine Valk. Vanuit Melbourne rijden we via de CityLink (dagpas 8.50 AUD) rechtstreeks naar het Dandenong Ranges National Park en gaan wandelen door het Sherbrooke Forest (15.00-17.00 uur) en in de Ferntree Gully (17.00-18.10). Daar beklimmen we de "1000 steps and Kokoda Trail" tot de schemer invalt. Dan op naar Ormond, een voorstad in het ZO van Melbourne. John en Henriette Strain nodigde ons uit om de rest van de tijd (tot 27-08-01) in hun huis te logeren.

Melbourne en omgeving

Sherbrooke Forest en Ferntree Gully

Maken deel uit van de Dandenong Ranges National Park, dat tussen de oostelijke voorsteden van Melbourne ligt. Op beide plaatsen gigantische bomen ("Mountain ashes") en vooral in "gullies" huizenhoge Boomvarens ("Ferntrees"). In de *Ferntree Gully* ontdekt Wouter vlak naast de Kokoda Trail een man Liervogel, die we mooi en langdurig kunnen bekijken tot de schemering invalt. Op de achtergrond horen we nog een andere.

In *Sherbrooke* 100-den handtamme Crismon Rosella's, wat Galah's en enkele Koningspapegaaien bij picknicktafels. Op 27-08-01 (erg nevelig, weinig zicht, 09.40-11.15) 1 Liervogel, Ganggang Cockatoo (hoog in bomen; geluid als van piepende deur die gesmeerd moet worden, daarna gekrijs als Sulphur-crested Cockatoo; eindelijk gezien), Golden Whistler, White-throated Treecreeper, Brown Thornbill, Eastern Yellow Robin en de fraaie Crescent Honeyeater die een welluidende zang laat horen.

Healesville Sanctuary

Bezocht op 25-08-01 met Tracey Gaspari. Collectie van inheemse dieren. Bell Miners zijn er erg talrijk en verschillende vrouwen Satin Bowerbirds vliegen vrij rond.

Phillip Island

Een afwisselend eiland op zo'n 150 km afstand van Melbourne. Wereldbekend om de Pinguinparade, bezocht op 26-08-02. Na ontbijt in Cowes met broodjes salade naar eigen keuze gaan we eerst naar het *Koala reservaat*. Daar zien we 11 "boombeertjes" en White-cheeked Rosella, White-plumed Honeyeater, Eastern Yellow Robin, Grey Shrikethrush. Vanaf 12.15 maken we een strandwandeling over *Anzacs Beach* met enkele onvolwassen en adulte "Pacific Gulls" (met grijs voorhoofd, winterkleed?) en een aangespoelde, dode "Common Diving Petrel". Met een paartje Kapplevieren ("Hooded Plover") ben ik in mijn sas. Het totale bestand van deze Zuid Australische endem wordt op slechts 5000 - 7000 vogels geraamd. Ze nemen nog altijd af omdat ze (te) weinig jongen groot brengen ten gevolge van verstoring door recreanten en badgasten.

Via *Rhyll Swamp*, met een enorme broedkolonie van Sacred en Straw-necked Ibis, Great, Pied en Little Pied Cormorant en White-breasted Woodswallow en Dusky Wood Swallow, en Cape Barren Goose rijden we naar Cowes voor de lunch.

Daarna op naar de uiterste westkaap bij de *Nobbies*. Vanaf het vlonderpad mooi zicht op de basaltkust, en de 100-den nestelende Silver Gulls. In de meeste (90%) nesten liggen nog geen eieren. Tussen de weelderige graspollen overal hollen van broedende Dwergpinguïns. Bij toeval vertoont er zich één zichtbaar wat aan de ingang. Met de telescoop zijn op de verder gelegen, lagere *Seal rocks* vele 100-den Australian Fur Seals (Australische Pelsrobber) zichtbaar. Over zee Australische Jan van Gent en Wenkbrauwwalbatros naar W., Kelp Gull, Little Black en Great Cormorant, en Sooty Oystercatcher.

Een wandeling naar een vogelhut bij *Swan lake* is geslaagd: zo'n 20 Swamp Wallibi's, Chestnut-rumped Heathwren, 3 roepende en bakkeleide Bruine Valken en Swamp harrier. Op het meer een 80 Zwarte Zwanen, 300 Eurasian Coot, Musk Duck, Australian Grebe, Pacific Black Duck. Op de omringende graslanden de beide Ibis en verschillende Australian Shelduck en Cape Barren Goose.

Om 17.30 gaan we naar de *Penguin parade* (15 AUD pp). We zijn niet de enigen, busladingen uit de hele wereld worden bij een groot bezoekerscentrum gelost. Omdat we nogal vroeg zijn kunnen we nog vooraan op de oostelijke tribune, vlak bij het strand, een zitplaats vinden. Het is nog wel wat wachten, de show begint pas goed nadat de duisternis volledig is ingevallen. In de schijnwerpers zien we zo'n 80 Dwergpinguïns in groepjes uit zee opduiken. De meeste aarzelen langdurig in de branding voor ze het strand op durven te wandelen; daarna marcheren ze langs de tribunes met toeristen omhoog naar hun broedholten. Na 20.00 wordt het minder, maar als we langs het vlonderpad terug wandelen zien we nog 10 tallen, vaak zeer nabij. Veel dragen vleugelmerken. In het donker doen hun bizarre geluiden sterk aan kermende baby's in het herinneren.

BENSTEAD P. J. & JEFFS C. J. S. 1990. Australia 88/89. DBTRS, Groningen.

DE BOER M. 1994. A birding travel report about Australia: Queensland, Northern Territory and New South Wales. DBTRS, Groningen.

ENTWISTLE M. 1987. 600+: A birders guide to Australia. DBTRS, Groningen.

HARRISON K. K. 1990. Australia 1989: selective updates and new sites. DBTRS, Groningen.

SIMPSON K., DAY N. & TRUSLER P. 1999. Field Guide to the birds of Australia. 5th revised ed., Penguin Books Australia Ltd., Ringwood pp. 1-400, Au. \$ 35.00.

SLATER P. & SLATER R. 1998. The Slater Field Guide to Australian birds. 2nd revised ed., Landsdowne Publishing Pty. Ltd., The Rocks pp. 1-344, AU. \$ 29.95.

Why are Koalas so Dozy?

It's all to do with their diet of eucalypt leaves. These carry a formidable load of poisons as a defence against insects. They are also made up mostly of cellulose, a fibrous material that animals cannot digest. Koalas must therefore rely on bacteria living in their stomachs to do the job for them. The process is efficient but slow, which implies a hefty cargo of foliage in the stomach while it happens. The extra weight does not matter much to a cow chewing cud in a meadow but it does matter to an animal that must also be small enough to manoeuvre in the tops of trees. The Koala's evolutionary response to this impasse has been to make do with less food. Its metabolism is only about half that of comparable mammals, and it also has a low 'activity budget' — Koalas spend about 80 per cent of a typical day asleep.

Why are Koalas Finicky Eaters?

A Koala's liver has an impressive armoury of chemical devices to neutralise the complex broth of eucalypt toxins that enter its bloodstream but this chemical wizardry consumes energy. The overall toxin load in eucalypt foliage varies enormously with age, season and many other factors. Only by careful selection of young leaves with low toxin levels can the Koala hope to derive an overall energy surplus, so they have become very finicky eaters.

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
B=2-10; C=11-100; H=heard									
Emu	.	.	.	13	60
Southern Cassowary	droppings	.	.
Little Penguin	(1)	80	.
Australasian Grebe	.	3	2	.	.	C	40	B	.
Great Crested Grebe	.	25
Black-browed Albatross	(5)	1	.
Yellow-nosed Albatross	(2)
Wandering Albatross	(1+)
Fluttering Shearwater	1 (18)
Fairy Prion	(10)

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
B=2-10; C=11-100; H=heard									
Providence Petrel	(17)
White-faced Storm-petrel	(1)
Common Diving Petrel	dead	.
Brown Booby (Michaelmas Cay)	150
Australian Gannet	B (B)	2	2	.
Australian Pelican	.	5	.	.	33	28	.	B	.
Australasian Darter	B	.	.	3	B	C	+	.	.
Pied Cormorant	A	+	+	.
Little Pied Cormorant	B	2	.	+	.	C	+	+	.
Great Cormorant	B	.	.	2	.	B	.	+	.
Little Black Cormorant	.	1	.	3	.	C	+	+	.
White-necked Heron	.	.	.	+	.	B	.	.	A
White-faced Heron	.	A	.	A	B	B	.	.	.
Great Egret	.	.	.	B	B
Little Egret	.	.	.	A	B	C	B	.	.
Intermediate Egret	B	B	.	.	.
Eastern Reef Egret	.	1	.	.	2
Cattle Egret	.	200	.	D	.	C	.	.	.
Rufous Night Heron	.	.	.	1	1
Striated Heron	.	A	.	.	2
Glossy ibis	A	.	.	.
Australian Ibis	D	C	.	C	C	+	40	E	.
Straw-necked Ibis	.	150	.	300	C	C	80	E	.
Royal Spoonbill	18	B	.	.	.
Yellow-billed Spoonbill	.	.	.	B	.	B	.	.	.
Black-necked Stork	1+nest	.	.	.
Cape Barren Goose	5	.
Magpie Goose	B	400	.	.
Green Pygmy Goose	12	B	.	.
Wandering Whistling Duck	1
Plumed Whistling Duck	2600	.	.
Black Swan	.	3	.	.	.	B	.	60	.
Australian Shelduck	B	B
Maned Duck	B	C	B	C	.	60	+	?	B
Pacific Black Duck	C	C	B	C	C	D	+	B	.
Australian Grey Teal	.	.	.	60	.	80	C	.	.
Chestnut Teal	2
Pink-eared Duck	20	.	.
Hardhead	B	B	.	.
Blue-billed Duck	.	6
Musk Duck	.	.	.	pr	.	.	.	2	.
Osprey	2
Black-shouldered Kite	.	1	.	7	.	.	.	40	12
Black Kite	.	.	.	2	150	22	45	.	6
Whistling Kite	1	B	2	.	.
Brahminy Kite	ad

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
B=2-10; C=11-100; H=heard									
Swamp Harrier	.	1	.	6	.	1	2	2	.
Pacific Baza/Crested hawk	1	.	.	.
White-bellied Sea-Eagle	.	1	.	.	2	1	imm	.	.
Wedge-tailed Eagle	.	.	.	8
Little Eagle	.	.	.	1	.	4	1	.	.
Collared Sparrowhawk	.	1	.	.	.	A	.	.	1
Australian Hobby	1
Brown Falcon	.	.	.	2	.	1	.	3	1
Black Falcon	.	.	.	1
Peregrine Falcon	2,1	1	.	.	2
Nankeen, Australian Kestrel	fem.	1	.	6	.	.	.	8	B
Mallee Fowl	pair
Australian Brush Turkey	B	B	.	.
Orange-footed Scrubfowl	2	B	B	.	.
Buff-banded Rail	B	2	.	.	.
Red-necked Crake	A	.	.	.
Baillon's Crake ?	?
White-browed Crake	6
Dusky Moorhen	B	B	4	.	B	.	B	B	.
Eurasian Coot	B	300	.
Purple Swamphen	.	.	.	35	20	.	80	.	.
Australian Bustard	8	.	.	.
Sarus Crane	8	.	.
Coomb-crested Jacana	4	C	.	.	.
Bush Stone-curlew	H	H	.	.	.
Black-winged Stilt	B	40	C	.	40
Red-necked Avocet	40
Sooty Oystercatcher	.	2	1	.
Red-capped Plover	4	B	.	.	B
Black-fronted Dotterel	18	8	.	.	.
Hooded Plover	pair	.
Masked Lapwing	B	B	.	B	C	C	+	+	B
Great Knot	100ad
Sharp-tailed Sandpiper	2juv
Red-necked Stint	12ad
Curlew Sandpiper	12ad
Eastern Curlew	30
Whimbrel	10
Bar-tailed Godwit	6ad
Greenshank	ad
Common Sandpiper	1	.	1	.	.
Grey-tailed Tattler	100ad
Wandering Tattler	1ad?
Latham's Snipe	1	1	.	.	.
Silver Gull	D	+	.	.	D	.	.	E	+
Pacific Gull	5	.

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
B=2-10; C=11-100; H=heard									
Kelp Gull	2	.
Caspian Tern	10	B	.	.	.
Gull-billed Tern	21
Arctic Tern	(2)
Black-naped Tern (Michaelmas Cay)	12
Sooty Tern (Michaelmas Cay)	E
Crested Tern (M. Cay)	(C)	A	.	4 (100)
Common Noddy (M. Cay)	E
Wompoo Fruit-Dove	A	.	.	.
Topknot Pigeon	8	.	.	.
Feral Pigeon	+	+	.	+	.	.	.	+	+
Spotted Turtle-Dove	.	B	.	.	+
Brown Cuckoo-Dove
Peaceful Dove	.	B	.	+	+	C	.	.	+
Bar-shouldered Dove	+	C	.	.	.
Emerald Dove	B	.	.	.
Common Bronzewing	.	B	.	B	.	.	.	B	B
Crested Pigeon	C	?	?	+	.	.	.	+	+
Galah	.	20	B	D	.	2	.	D	+
Long-billed Corella	.	9	.	300+	.	.	.	20	.
Pink Cockatoo	2
Sulphur-crested Cockatoo	C	C	C	D	+	C	+	C	C
Yellow-tailed Black Cockatoo	2	20
Gang-gang Cockatoo	.	.	+	2	.
Rainbow-Lorikeet	C	.	B	.	D	D	+	C	.
Scaly Breasted Lorikeet	C	.	.	.
Purple-crowned Lorikeet	2
Double-eyed Fig-Parrot	2	.	.	.
King Parrot	.	.	6	4	.
Crimson Rosella (P.e.elegans)	B	B	C	250	.
Yellow Rosella (P.e.flaveolus)	.	.	.	C
Pale-headed Rosella	B	.	.	.
Eastern Rosella	.	.	4	C	.
Ground Parrot	.	1(+1d)
Australian Ringneck Parrot	B
Red-rumped Parrot	.	.	.	C	C
Blue Bonnet	.	.	.	6
Pallid Cuckoo	1
Fan-tailed Cuckoo	.	H	.	H	.	.	.	H	2
Gould's Bronze-cuckoo	1	.	.	.
Barn Owl	4	.	.	.
Lesser Sooty Owl	m+juv	.	.	.
White-rumped Swiftlet	C	C	.	.	.
Papuan Frogmouth	pair	.	.	.
Azure Kingfisher	.	2	.	.	.	4	.	.	.

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
Little Kingfisher	4	1	.	.	.
Laughing Kookaburra	2	B	20	15	+	C	.	B	B
Blue-winged Kookaburra	H	.	.	.
Forest Kingfisher	4	B	.	.	.
Rainbow Bee-eater	B	.	.	.
Noisy Pitta	H	2	.	.	.
Superb Lyrebird	.	H	8	2m	.
Skylark (Veldleeuwerik)	1 song	.	.
Welcome Swallow	+	+	B	+	.	+	.	+	+
White-backed Swallow	1
Tree Martin	+	.	.	+	.	C	.	.	+
Fairy martin	?	.	.	.
Richard's Pipit	.	4	?
Ground Cuckooshrike	.	.	.	B
Black-faced Cuckoo-shrike	.	C	.	+	.	.	.	+	+
White-bellied Cuckoo-shrike	B	C	.	.
Barred Cuckoo-shrike	B
Crimson Chat	pr
Varied Triller	+	.	.	.
Yellow-breasted Boatbill	2	.	.	.
Lemon-bellied Flycatcher	B	B	.	.
Leaden Flycatcher	+	.	.	.
Brown Flycatcher (Jacky Winter)	.	.	.	B	B
Spectacled Monarch	C	.	.	.
Grey Fantail	.	A	A	B	+	B	B	.	.
Northern Fantail	2	.	.	.
Rufous Fantail	B	B	.	.
Willie Wagtail	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hooded Robin	1	.
Eastern Yellow Robin	.	.	B	B	.
Grey-headed Robin	C	B	.	.
Pale -yellow Robin	B	.	.	.
Southern Scrub-robin	2
Bassian Thrush	2	.	.	.
Blackbird	.	.	.	+	.	.	.	+	+
Golden Whistler	2	1	3	.
Grey Whistler	+	.	.	.
Rufous Whistler	+	.	.	.
Little Shrike-thrush	B	.	.	.
Grey Shrike-thrush	.	B	C	B	.	B	.	B	.
Crested Shrike-tit	.	.	.	2
Eastern Whipbird	.	H	H	.	.	B	B	H	.
Grey-crowned Babbler	B	.	.	.
White-browed Babbler	.	.	.	B	B
Red-Whiskered Bulbul	B	B
Superb Fairy-wren	12	B	C	B

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
B=2-10; C=11-100; H=heard									
Splendid Fairy-wren	6
Variegated Fairy-wren	.	2 ?	B
Red-backed Fairy-Wren	B	.	.	.
White-browed Scrubwren	B	B	C	B	.
Atherton Scrubwren	3	.	.
Large-billed Scrubwren	.	A	.	.	.	B	.	.	.
Yellow-throated Scrubwren	B	.	.	.
Chestnut-rumped Heathwren	.	B	B	.
Shy Heathwren	A
Redthroat	B
Rockwarbler (Origma)	.	.	2
Pilotbird	.	.	2
White-throated Treecreeper	.	.	H	B	.	.	?	B	.
Brown Treecreeper	.	.	.	B	4
Mangrove Gerygone	A
Large-billed Gerygone (Daintree)	B	.	.	.
Brown Gerygone	.	.	1
Weebill	.	B	.	C
Mountain Thornbill	B	.	.
Yellow Thornbill	.	?	.	B
Brown Thornbill	.	B	4,?	.
Striated Thornbill	.	.	C	B	.	.	.	C	.
Yellow-rumped Thornbill	B
Buff-rumped Thornbill	.	B	A
Red Wattlebird	+	+	+	+	.	.	.	+	+
Brush Wattlebird	.	C	C	.
Bell Miner	.	.	C	C	.
Noisy Miner	+	.	+	+	+
Yellow-throated Miner	+
Helmeted Friarbird	+
Noisy Friarbird	.	.	?	.	.	C	.	.	.
Little Friarbird	.	.	B
Blue-faced Honeyeater	C	.	.	.
Macleay's Honeyeater	C	+	.	.
Lewin's Honeyeater	.	.	B	.	.	B	+	.	.
Yellow-spotted Honeyeater	C	+	.	.
Graceful Honeyeater	B	.	.	.
Yellow-faced Honeyeater	+	.	.	.
Singing Honeyeater	A
Yellow Honeyeater	+	+	.	.	.
White-eared Honeyeater	A
White-throated Honeyeater	H	.	.	.
Scarlet Honeyeater	B	.	.	.
Dusky Honeyeater	+	B	.	.	.
Yellow-plumed Honeyeater	C
Yellow-tufted Honeyeater	.	.	B

Australië 2001. Maximum dagtotaal per locatie. ? = niet zeker

	Sydney (Pel.t)	RNP + BG	Blue Mtns	Deniliquin	Cairns	Kingfisher Park	Atherton Tablelands	Melbourne	Wyperfeld
B=2-10; C=11-100; H=heard									
Fuscous Honeyeater	A
White-plumed Honeyeater	.	.	.	+	.	.	.	+	?
Crescent Honeyeater	3	.
New Holland Honeyeater	B	C	D	+	C
Tawny-crowned Honeyeater	.	B	2
Eastern Spinebill	.	B	C
Mistletoebird	B	.	.	.
Yellow-bellied Sunbird	+	B	.	.	.
Silveryeye	.	20	.	.	.	B	.	.	.
Striated Pardalote	.	.	.	B	.	B	.	.	.
Beautiful Firetail	.	2
Diamond Firetail	.	.	.	3
Crimson Finch	pair
Red-bowed Firetail (Finch)	.	.	B	B	.	C	.	.	.
Nutmeg Mannikin
Chestnut-breasted Mannikin	25
Goldfinch (Putter)	.	20	A
House Sparrow	+	+	+	+	.	.	.	+	D
Metallic Starling	12
Common Starling	+	+	+	600	.	.	.	+	+
Common Myna	+	+	.	.	+	+	+	+	.
Yellow oriole	B	B	.	.	.
Figbird	.	4	.	.	B	C	+	.	.
Spangled Drongo	A	A	.	.
Satin Bowerbird	.	.	male	6 fem.	.
Great Bowerbird	6	.	.	.
Golden Bowerbird	male	bower	.	.
Tooth-billed Bowerbird	H	1+H	.	.
Spotted Catbird	B	3	.	.
Victoria's Riflebird	5	3	.	.
Magpie-Lark	+	+	+	+	+	+	+	+	+
White-breasted Woodswallow	C	.	B	.
Black-faced Woodswallow	.	.	.	6
Dusky Woodswallow	1	.
Black Butcherbird	B	+	.	.	.
Pied Butcherbird	?	.	.	1
Grey Butcherbird	.	A	A
Australian Magpie	+	+	+	+	.	B	+	+	+
Pied Currawong	C	C	C
Grey Currawong	.	.	1	1
White-winged Chough	.	.	.	C	25
Torresian Crow	B	B	+	.	.
Little Raven	.	.	.	B
Australian Raven	+	+	+	+	+
species:	283								