Slikken van de Heen (oost) met o.a. Reuzenberenklauw)

PDF 5

Bij ieder bezoek keken we vanaf het Benedensas uit over de Slikken vd Heen oost (links), de Dintelse Gorzen (rechts) en het Volkerak in de verte. Op deze oude dia is de bosvorming nog in het beginstadium. Dat is op de volgende foto, jaren later, wel even iets anders.

De **Gewone Vlier** *(Sambucus nigra)* staat in bloei. In de zomermaanden is het een hele worsteling om hier doorheen te komen. Links een stukje van de Heense Dijk.

De bloemschermen van de **Vlie**r verspreiden een typische geur.

Je kunt ze zo in een glas heet water doen voor de bekende vlierbloesemthee. Schijnt nog gezond te zijn ook.

Het blad van deze Vlier is heel anders dan van de Vlier op de vorige pagina.

Het is de **Peterselievlier** *(Sambucus nigra var. Laciniata)*. De bladeren lijken enigszins op Peterselie. Hij is niet zeldzaam, maar toch minder algemeen dan de Gewone Vlier.

Ik heb de **Spreeuwen** eens met hele zwermen tegelijk aan zien vallen op de rijpe **vlierbessen**. Dat was me een kabaal! Elke Spreeuw dacht blijkbaar dat de beste bessen bij een ander stonden!

Mijn vriendin **Dineke Pierrot** (1932-1995) maakte van de vlierbessen lekkere jam. Als je geluk had kreeg je wel eens een potje.

Het weer moest al heel erg slecht zijn als de tellingen niet doorgingen.
Het spoor in de sneeuw is niet van ons. Mogelijk van Reeën.

Op 11 januari 1997 deed zich de unieke situatie voor dat we over het ijs naar het eilandje konden lopen. Ongeveer 200 meter. (Witte stippellijn).
Helaas geen foto’s daarvan. Je had al moeite genoeg om overeind te blijven!

Ik heb hier twee foto’s samengevoegd om de situatie van 9 april 1994 weer te geven.

Ik zat tegen een kreekrand te schuilen voor een ziedende sneeuwbui. De sneeuw viel niet recht naar beneden, zoals op de foto, maar jakkerde vrijwel horizontaal door de lucht.

Als een spookverschijning vloog daar een **Roerdomp** *(Botauris stellaris)* doorheen. Het beeld staat 26 jaar later nog steeds op mijn netvlies gegrift.

Geen bundels touw, maar platliggend gras opgefleurd met een laagje sneeuw.

Dit zou je ook voor een sneeuwfoto kunnen verslijten.
Het is echter wilgenpluis!

Terwijl de vogelwerkgroep in de ruigte verdwijnt (links) hield ik me nog even bezig met de verdorde ‘stammen’ van de **Reuzenberenklauw** *(Heracleum mantegazzianum)*.

Het leek wel een woud uit de prehistorie! Hij wordt ook wel **Perzische Berenklauw** genoemd.

Sommige stengels schoten (binnen enkele maanden tijd) tot meer dan 3.50 meter de lucht in en hadden aan de voet een omvang van 26 cm.

Deze **Reuzenberenklauw** leek wel een futuristisch ruimteschip neerdalend uit de donkere wolken.

De bladeren van de **Reuzenberenklauw** komen uit de bladschede tevoorschijn. De plek die het witte pijltje aanwijst is op de rechterfoto uitvergroot. De eitjes van een **Lieveheersbeestje!**

Je een weg banen door de **Reuzenberenklauw** is niet aan te bevelen. Als de stevige haartjes op de plant afbreken kan het sap blaren veroorzaken en zelfs bloedvergiftiging.

Onder meer door de grootte en de rode vlekken op de stengel onderscheidt Reuzenberenklauw zich van ‘onze eigen’ **Gewone Berenklauw** *(Heracleum sphondylium)*

Reuzenberenklauw heeft vanzelfsprekend ook reusachtige bloemschermen. Elk bloemscherm kan wel uit 100 kleinere schermpjes bestaan.

Het schelpstrandje was eigenlijk het enige gedeelte van het gebied dat goed begaanbaar was. Links het Volkerak met op de achtergrond het beboste eilandje

Klein Schorrenkruid (*Suaeda maritima*) omgeven door het witte pluis van **Zulte** *(Aster tripolium*. Naarmate het seizoen vordert verandert het schelpstrandje van kleur.

Blaasspirea of **Sneeuwbalspirea** *(Physocarpus opulifolius).*

Als die uit zichzelf op de Slikken vd Heen terecht is gekomen zou dat wel bijzonder zijn.

Gras- en zeggesoorten krijgen over het algemeen niet de aandacht die ze verdienen. **Oeverzegge** *(Carex riparia)* is een van de grootste zeggesoorten van Nederland. Bovenaan zien we de bruine, vrijwel uitgebloeide, mannelijk bloemen. De vrouwelijke bloemen zitten eronder en vangen het stuifmeel op.

De witte driedelige stempels van de vrouwelijke bloemen. Ze zijn ruw behaard waardoor het stuifmeel nog beter blijft hangen.

Dit roestig geval stond jarenlang op de Heense Dijk. De banden moeten nodig worden opgepompt!

De **Zwartgerande Tuinslak** *(Cepaea nemoralis)* lijkt veilig in zijn huisje. Niet dus! Op de grote foto is een zogenaamde ‘lijstersmidse’ te zien. Op een steen langs de Heense Dijk heeft een **Zanglijster** of **Merel** een aantal slakkenhuisjes kapot geslagen.

Op de Slikken vd Heen oost langs de Heense Dijk heeft zich een soort bosje van de **Es** *(Fraxinus excelsior)* ontwikkeld. (Olijffamilie). Door zijn fluweelachtige zwarte knoppen is hij ook in de winter goed herkenbaar.

De bloesem (linksboven) wordt soms aangetast door de **Essenbloesemmij**t *(Aceria fraxinivora)* (linksonder). De bloemkoolachtige bolletjes blijven heel de winter nog aan de boom zitten.

De zaadproductie (boven) is van dien aard dat een uitbreiding van het Essenbosje er wel in zit!

Als de vogels gaan ruien is dat langs de waterkant soms te merken.

Links nog een klein gedeelte van het schelpstrandje.

We zijn weer terug bij het **Benedensas**. Via het Kastanjelaantje daal je af naar de parkeerplaats.

Destijds kon je de route een heel stuk bekorten door dit bruggetje over de **Paardenkreek** te nemen! (Enige doodsverachting was wel vereist!)

toine.rommers@gmail.com